

Overbiotic L. A®

ANTIBIOTICO DE AMPLIO ESPECTRO Y LARGA ACCIÓN

(Oxitetraciclina al 20%)

DESCRIPCIÓN:

Overbiotic L.A. es una solución estable y estéril de Oxitetraciclina base al 20% en excipiente de liberación lenta lista para usar. Posee amplio espectro antimicrobiano. Dada la formulación y concentración del principio activo, con Overbiotic L.A. se logra una rápida acción y niveles terapéuticos de droga durante 3 a 5 días.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml. contiene:

Oxitetraciclina base 20 g.
Excipientesc.s.p.

INDICACIONES:

Para el tratamiento de enfermedades específicas e inespecíficas provocadas por gérmenes susceptibles a la Oxitetraciclina.

BOVINOS: anaplasmosis, neumonías, leptospirosis, pododermatitis, mastitis, metritis, carbunco sintomático, enteritis bacteriana, artritis, heridas infectadas.

OVINOS: neumonías, carbunco sintomático, pododermatitis, mastitis, metritis, infecciones post-parto, etc.

PORCINOS: neumonías y otras enfermedades respiratorias, leptospirosis, enteritis bacterianas, mastitis, metritis, diarrea de los lechones, infecciones post-quirúrgicas y post-parto.

Otras infecciones específicas e inespecíficas causadas por gérmenes sensibles a la Oxitetraciclina.

ADMINISTRACIÓN:

1 ml. por cada 10 k.p.v. (200 mg de Oxitetraciclina base por cada 10 k.p.v)

BOVINOS Y OVINOS: intramuscular profunda en grandes masas musculares (nalga, cadera y cuello). Cuando la dosis supera los 20 ml se debe aplicar en dos puntos (así se disminuye la reacción de los tejidos en el sitio de inyección). En ovinos de más de 50 kg de peso dividir la dosis aplicándola en dos lugares distintos

PORCINOS: En lechones de menos de 2 kg de peso no se debe administrar más de 0.5 ml debiendo aplicarse solamente por vía subcutánea. No se debe aplicar hierro por vía parenteral cuando se está usando Overbiotic L.A. cerdos entre 2 y 10

Kg de peso: 1 ml vía subcutánea. Cerdos de más 10 kg de peso: 1 ml cada 10 k.p.v. en un solo sitio por via intramuscular. Cerdos de más de 100 k.p.v.: 1 ml cada 10 k.p.v. dividiendo la dosis en dos puntos de aplicación.

Normalmente y en condiciones susceptibles es suficiente una sola aplicación de Overbiotic L.A. de 1 ml cada 10 k.p.v. en infecciones severas puede ser necesario

repetir el tratamiento a los 3-5 días de la primera inyección. Estas dosis pueden modificarse según criterio profesional.

RESTRICCIONES:

Uso veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula del médico veterinario. No sacrificar para consumo humano a los animales tratados hasta 28 días después del último tratamiento. No destinar la leche de los animales tratados a consumo o industria hasta pasados 07 días del último tratamiento.

PRESENTACIÓN:

Frascos de 250 ml. y 500 ml. de contenido neto.

REGISTRO ICA:

N° 6928-MV

**Medicamento veterinario elaborado por OVER
Organización Veterinaria Regional S.R.L.
Laboratorio de Especialidades veterinarias
Republica Argentina**

Cordialmente
JHON JAIRO DUQUE L. MVZ.
OVER S.R.L.